

Okénko zahrádkáře.

První polovina měsíce dubna byla teplotně nadprůměrná s minimem dešťových srážek – kolem 1 mm. Bohužel jsme zaznamenali opět jarní mrazíky (až -4°C), které opět poškodily květy meruněk a broskvoní, u broskvoní se jeví toto poškození o něco nižší než u meruněk. Stromy meruněk bez květů či plůdků jsou dnes již olistěné. Těsně po odkvětu jsou rané odrůdy švestek, renklód a mirabelek, v plném květu jsou stromy hrušní, třešní a višní. Na začátku květu jsou stromy u letních odrůd jabloní, Idaredu, Šampionu a Rubínu. V teplých lokalitách keře révy vinné jsou již vyrašené a v ostatních lokalitách mají révová očka ve fázi „holoubat“. Celkově je vegetační doba u trvalých kultur urychlená o cca 14 až 21 dní.

V této fázi vývoje je nutné počítat s ochranným postřikem u jabloní před květem - v chladnějších lokalitách a kde stromy ještě nekvětou. Tam, kde jsou stromy již rozkvetlé počkáme s postřikem až po odkvětu. Zaměřujeme se proti padlí jabloňovému a škůdcům. K postřiku použijeme přípravky proti padlí a strupovitosti: Discus 0,02% nebo Zato 50 WG 0,02% nebo Talent 0,05%, nebo Domark 10 EC 0,03% či Luna Experience 0,05% do kterého přidáme Decis Mega 0,02%, nebo Calypso 480 SC 0,025%, či Karate 0,01%. Je možné použít také nově vyráběný olejový prostředek Rock Effekt v koncentraci 1% na padlí a na škůdce, tento speciální olej navíc ještě odpuzuje i škůdce.

Nyní je také vhodná doba provést ochranný postřik u angreštu na mladé plůdky proti americkému padlí angreštovému přípravkem Discus 0,02% nebo Zato 50 WG 0,02% či Kumulus WG 0,5%.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

U stromů broskvoní, kde jsme před květem neprovedli jarní řez, je vhodné ještě počkat až budou znát mladé plůdky s tím, že pak máme možnost si vybrat plodné větvičky s mladými plůdky.

Půdní profil je velmi proschlý a je nutné podsazené či mladé stromky a révové sazenice podpořit vydatnou zálivkou. Na vrchní část půdy kolem stromku je vhodné „nastlat“ – „namulčovat“ zbytky rostlin či trávy, které zabraňuje vypařování vláhy z půdy.

-Čepička-