

Okénko zahrádkáře.

Druhá srpnová dekáda na Znojemsku byla teplotně nad dlouhodobým normálem s velmi rozdílným úhrnem dešťových srážek. Celkem bylo naměřeno od 11 mm (Hnanice) po 73 mm srážek (Branišovice). Celkové dešťové srážky od začátku měsíce srpna činí od 44 mm (Hnanice) po 102 mm (Branišovice). U broskvoní končí sklizeň plodů odrůdy Symphonie a plody odrůdy Cresthaven jsou ještě tvrdé. U slivoní a švestek, které mají všeobecně velkou sklizeň, jsou sklizeny plody odrůd Katinka, Čačanská rodna, Čačanská najbolje, Zelená renkloda i Mirabelka nancyská. Dozrávají plody odrůd Jojo, Stanley a Valor. U jabloní je celková násada plodů průměrná, dochází k padání plodů, jak v důsledku červivosti, tak v důsledku vytěsnění jednotlivých plodů ve shlucích. Sklizeny jsou plody odrůdy Discowery, dozrávají plody odrůdy James Grive a Summered. Vysoké teploty v minulém týdnu se projeví stále vysokou aktivitou letu obaleče slupkového. U révy vinné jsou stále velké přírůstky letorostů révy vinné s bohatou listovou plochou. Je značný výskyt plísňové révové na mladých listech, „oustoupila“ kadeřavost a plstnatost listů. U citlivých odrůd v uzavřených lokalitách je zaznamenán na hroznech výskyt padlí. Objevují se u dalších keřů nové příznaky chřadnutí révových keřů (ESCA). V důsledku vysokých dešťových srážek a vyšších teplot jsou signalizovány velmi dobré podmínky především pro vývoj plísňové šedé, révové a „průměrné“ u padlí révy.

V tomto týdnu bude stále ještě aktuální ochrana jaderovin proti obaleči slupkovému a preventivnímu ošetření proti hořké pihovitosti plodů. K ochrannému postřiku použijeme přípravky: Decis Mega 0,02% nebo Dimilin 48 SC 0,025% či Mospilan 20 SP 0,025% a přidáme přípravek s vápníkem na hořkou pihovitost plodů – Wuxal Calcium 0,2%.

Révu vinnou ošetřujeme v intervalu 10 dní po posledním ošetření. Použijeme přípravky: Champion 0,3% nebo Kuprikol 0,5% (z vlastních zásob) na lepší vyzrání révy a proti hnilobě hroznů přidáme Mythos 30 SC 0,25% nebo Scala 0,2%, či Teldor 50 SC 0,1% nebo Thiram Granuflo 0,4% - oba z vlastních zásob.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

U keřů révy vinné pokračujeme s opakovaným ošedkováním letorostů nad horním dvojdrátím. S odlistěním zóny hroznů můžeme začít po předpokládaném ochlazení na začátku tohoto týdne, především u modrých a pozdních bílých odrůd.

U stromů broskvoní začneme s letním řezem po sklizni plodů a provádíme jej až do poloviny září. Bakteriózy, které jsou příčinou chorob „dřevní hmoty“, se v době vegetace špatně dostávají do řezných ran letorostů i větví. Letní řez provádíme částečným „zmlazením a prosvětlením“ stromů se záměrem stálého snižování výšky i objemu korun, úměrně stáří a velikosti stromů. U broskvoňových stromů daleko více provádíme detailní řez zahradnickými nůžkami než u meruněk. Snažíme se zmenšovat délku dvou až tříletých postraních větví na základních kosterních větví zakrácením na vhodný jednoletý výhon, který již nezakracujeme. Letní řez provádíme podle vzrůstnosti stromu i délce jednoletých výhonů. Počítáme s ponecháním většího množství jednoletých výhonů jako „rezervy“ pro případ poškození zimními či pozdně jarními mrazy. Počítáme také s tím, že základní řez stromů broskvoní provádíme na jaře v období těsně před květem.

-Čepička-