

Okénko zahrádkáře.

První březnová dekáda byla teplotně i srážkově mírně pod dlouhodobým normálem. Zimní spánek ovocných dřevin skončil koncem ledna až začátkem února a tak vidíme u meruňkových stromů raných odrůd zvětšené květní pupeny s fialovým odstínem barvy. Stávající teploty jsou pro teplomilné dřeviny zatím nižší a trochu oddalují jejich rašení a zvětšování květních pupenů. Toto u meruňkových stromů posunuje částečně termín kvetení na pozdější dobu, což by bylo z hlediska poškození květních pupenů mrazíky bylo dobře. Měsíc březen je optimálním termínem pro řez révových keřů a s ohledem na bakteriální chřadnutí keřů révy (ESCA) je tento termín spíše doporučován na konec tohoto měsíce. Je doporučováno řezat révu ve dnech bez dešťových srážek. V rámci prevence proti této bakteriální chorobě ponecháváme na keři dva kmínky a snažíme se při řezu révových keřů v časovém horizontu 5 až 7 let o obnovu kmínků. Révové keře, které byly postiženy v loňském roce chřadnutím keřů (ESCA) máme označeny a řežeme je samostatně, obvykle seřízneme kmínek až k patě kmínku. Nůžky či zahradnickou pilku musíme desinfikovat stávajícími přípravky na bázi etanolu, můžeme použít také i desinfekci na Covid 19. Po loňském „normálním“ průběhu počasí mají révové keře o něco delší přírůstky réví. Počet ponechaných oček stanovujeme podle kondice révové keře, odrůdy i našeho záměru optimálního zatížení keře v závislosti na výši úrody a požadované kvalitě hroznů. Na keři nařezáváme u velmi plodných odrůd s velkým hroznem (VZ, MT, RV, And, ZW, Dornf, CM) 4 – 6 oček / m², u středně plodných odrůd se středně velkým hroznem (Hib, Char, MM, RB, SZ, VČR, FR, MP) 6 – 9 oček / m² a u málo plodných odrůd s malým hroznem (RR, Pál, RŠ, SG, TČ. Ker, RM) 10 – 12 oček / m². Při řezu používáme osvědčený systém Gytova řezu. To znamená že, ze dvou letorostů na záloze, horní seřízneme na tažen s 6 – 10 očky a spodní nařízneme na zálohu se dvěma očky. Celý loňský tažen s letorosty odstraňujeme. S řezem jaderovin můžeme začít v druhé polovině měsíce března. U peckovin provádíme všeobecně řez až po vyrašení pupenů, nejpozději pak u broskvoní – až těsně před začátkem jejich kvetení.

Proti kadeřavosti listů u broskvoní jsme provedli postřik podle signalizace již před cca 14 dny. Další ošetření provedeme v případě deštivého počasí ještě jednou měďnatými přípravky. K tomu použijeme jeden z přípravků: Florbrix 0,3% nebo Champion 50 WP 0,6% nebo Kocide 2000 0,35% či Kuprikol 50 0,6% z vlastních zásob. Tyto přípravky používáme v růstové fázi nalévání pupenů až do počátku rašení vrcholových pupenů. V pozdějším stádiu po vyrašení pupenů použijeme přípravky Dithane M 45 0,3% nebo Delan Pro 0,2% či Novozirn MN 0,2-0,3%.

U jaderovin a peckovin na ochranný jarní postřik proti škůdcům je ještě dosti času, provádíme jej ve stádiu zeleného květního poupěte a k tomu používáme přípravky na bázi olejů.

Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.

Ing. Jaromír Čepička.