

Okénko zahrádkáře.

Průběh počasí v měsíci březnu můžeme z hlediska teplot charakterizovat jako podprůměrný s úhrnem dešťových srážek ve výši 15 - 24 mm, což je mírně pod dlouhodobým průměrem.

Stávající teploty jsou pro teplomilné ovocné druhy zatím nižší a trochu zpomalují jejich vývoj, což je dobré. Květní pupeny u meruněk jsou značně zvětšené a také barevně výrazné, především u raných odrůd. Chladnější průběh měsíce března posunuje částečně u meruňkových stromů termín kvetení na pozdější dobu, což by z hlediska poškození květních pupenů jarními mrazíky bylo dobře. Ještě můžeme pozorovat zvětšování květních pupenů také u hrušní.

U angreštu a rybízu, jež mají vyrašené pupeny, je nyní vhodná doba pro preventivní postřik proti americkému padlí angreštového a vlnovníku rybízovému přípravky Kumulus WG 0,3%, nebo Zato 50 WG 0,015% a přidáme Rock Effect 2% nebo řepkový olej 2%.

Pokud máme na zahrádce česnek, je již vhodná doba pro chemický zásah proti houbomilce česnekové. K tomu používáme Karate 0,05% nebo Reldan 40 EC v koncentraci 0,125% z vlastních zásob.

S postřikem jádovin proti houbovým chorobám a přezimujícím škůdcům zasahujeme až v období fenofáze zeleného květního poupěte, což časově znamená asi za tři až čtyři týdny.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

Během měsíce března začneme u jádovin s tzv. zimním řezem. Musíme mít na paměti tu skutečnost, že později provedený řez nám snižuje růstovou aktivitu stromů a řezné rány jsou méně napadány bakteriozami. U starších stromů používáme způsob každoročního menšího „průklestového“ řezu pilkou, kdy snižujeme výšku stromů zkrácením kosterních větví na mladší větev končící jednoletým výhonem. Jinak odstraňujeme všechny mladé jednoleté konkurenční výhony či tzv. vlky. Mladé stromy vždy začínáme řezat o něco později a provádíme tzv. výchovný řez. Odstraňujeme konkurenční a další výhony, které by zahušťovaly korunu stromu a úměrně zkrátíme hlavní - kosterní výhony na venkovní očko. Musíme mít také na paměti tu skutečnost, že později provedený řez nám snižuje růstovou aktivitu stromů, což někdy využíváme záměrně u bujně rostoucích mladých stromků řezem v období květu. U mladých stromků zamazáváme všechny řezné rány. K tomu používáme různé stromové balzámy či barvu Latex do které přidáme univerzální fungicidní přípravek proti houbovým chorobám.

Nyní začíná vhodný termín pro výsadbu ovocných stromků. U stromků meruněk a broskvoní ještě určitou dobu počkáme, až budou pupeny mírně narašené a kdy se v této vývojové fázi nejlépe „ujímají“. Nadzemní část koruny upravíme zkrácením větviček asi o dvě třetiny na venkovní očko a řezné rány zamazáváme štěpařským voskem či stromovým balzámem. U kořenů obnovíme řezné rány až na zdravou část. Do hluboko vyrytých jam přidáváme na dno pro zlepšení výživy stromků malou hrstku hnojiva Cererit a také granulát Humag Agro, který zlepšuje vláhové a výživové vlastnosti půdy. Pak přidáváme kompost nebo velmi kvalitní zeminu. Stromky při výsadbě sázíme stejně hluboko, jako byly v ovocné školce. Po zahrnutí jamky z větší části objemu zeminou vydatně zalijeme vodou a po vsáknutí vody dosypeme zeminu do potřebné výšky.

Jaromír Čepička