

Okénko zahrádkáře.

První dubnová dekáda byla prakticky bez dešťových srážek s teplotně velmi proměnlivým počasím. Na začátku dekády bylo dosaženo letních teplot, na konci dekády se výrazně ochladilo a bohužel došlo k poklesu teplot pod bod mrazu. Nejnižší teploty byly v noci na pátek 9. dubna, kdy na Znojemsku bylo naměřeno od -2°C do -6°C . Tyto mrazy velmi silně poškodily rozkvetlé květy mandloní, meruněk a broskvoní. Pokud byly květní pupeny ještě uzavřené, tak toto poškození bude nižší a lze předpokládat, že z těchto pupenů rozkvetou květy, které doufejme, poskytnou „určitou úrodu“. V tomto ohledu jsou na tom lépe „studené lokality“ s opožděným vývojem a také pokud je zde pěstována odrůda Velkopavlovická s pozdějším začátkem květu. U těchto plodných stromů bych doporučil ještě provést ochranný postřik proti moniliové úžehu květů a odložit řez až po sklizni plodů. Podle vývoje vegetace bude nutné ke konci tohoto týdne po oteplení počítat u slivoní, švestek, višní, třešní a hrušní s předjarním postřikem proti líhnoucím se škůdcům přípravky na bázi olejů s insekticidem. U jabloní je vhodné ještě počkat, nicméně pokud máme málo stromků jabloní, je možné ošetřit společně s peckovinami. Ochranný postřik provádíme ve stádiu zeleného květního poupěte. Na tento postřik jsme dříve používali přípravky Ekol, Oleoekol či Ekalux, v současnosti se vyrábí pouze ochranný prostředek Rock Effekt ze stromu Pongamia, jež se aplikuje v 2% koncentraci a který odpuzuje škůdce. Do postřiku přidáme Reldan 22 (letos končí registrace přípravku) v koncentraci 0,27%, nebo Mospilan 0,05% či Karate 0,05% a také Champion 0,4% proti chorobám „dřeva“. Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno. V nastávajícím období je vhodný termín pro výsadbu sazenic révy, půdní horizont, by měl být prohrát na 10°C . Do vyrytých hlubokých jamek přidáváme na dno hrstku hnojiva Cererit s přídatkem granulí Humac Agro, které zlepšuje vláhové a výživové vlastnosti půdy a které „promícháme“ rýčem se zeminou. Pak přidáme kompost nebo rašelinu se zeminou, na kterou pak dáme sazenici se zakrácenými kořeny. Pokud máme možnost, tak použijeme na zahrnutí sazenice zeminu z meziřadí. Po zahrnutí jamky z větší části objemu zeminou důkladně zalijeme vysazenou sazenici vodou a zahrneme zbytkem zeminy. Vrchní část sazenice je parafinovaná, takže ji nemusíme zahrnovat zeminou.

Jaromír Čepička