

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 1

Týden: 19

Období: 11. 5. - 17. 5. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ

V současné době nedochází k významným srážkám, ty očekáváme v průběhu tohoto týdne. Průměrné teploty se dosud držely pod normálem pro toto období. Tyto podmínky tedy spíše vylučovaly riziko nástupu padlí. Podprůměrné teploty by měly dle CHMU panovat až do 16. května. Na základě toho lze předpokládat, že podmínky pro šíření choroby budou nastupovat spíše pomaleji a zvolna. V oblasti Strážnice nebo Velkých Pavlovic se však již v tuto chvíli mírnější podmínky pro šíření infekce vyskytují. Na vinicích lze pár dnů po rašení, přibližně ve fázi 5-9 listů, začít s kontaktní ochranou a zajistit tak spolehlivou prevenci před prvními infekčními tlaky. Hlavní doporučené přípravky na následující období: SPIROX, TOPAS, příp. ROCK EFFECT


PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V minulém období po delší pauze mírně zapršelo. Od 1.5. se ve všech hodnocených oblastech objevil nevýznamný maximální úhrn srážek do 2 mm. Také díky tomu zůstává nadále půdní vlhkost na většině území v normě. Tyto faktory se podílí na tom, že k primárním infekcím dosud na vinicích nemohlo dojít. S teplotami to bylo v posledních dnech jako na houpačce. Výraznější oteplení je očekáváno začátkem tohoto týdne. Podmínky pro šíření plísně révové jsou tímto minimální. V následujícím období se očekává rychlejší posun v růstu letorostů, zejména pokud se objeví predikované vydatnější srážky. Proto je na místě již nyní uvažovat o prvních preventivních postřicích na bázi kontaktního účinku. Vhodné budou především měďnaté fungicidy. Hlavní doporučené přípravky na následující období: CHAMPION, CUPROXAT.

OBALEČI


Umístění feromonových lapáků proti obalečům již mělo být provedeno v uplynulých týdnech. Motýli přezimující generace se díky mírnější zimě začali líhnout již v dubnu. Sledujte vývoj na lapácích na vinicích a dle signalizace případně volte k použití vhodné insekticidy, např. **KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ, STEWARD, LEPINOX PLUS.**

Výhled počasí



Další důležité informace:

V letošním roce panovaly delší dobu chladnější teploty. Réva se teprve až nyní začíná v růstu projevovat intenzivněji. Nyní lze předpokládat, že se začátkem týdne velmi rychle přiblížíme k vyšším teplotám. S výraznějším teplotním výkyvem by pak byl příhodný synchronní přísun srážek. Ten by v tuto chvíli mohl být potřebný zejména u mladých výsadb na sprašových a organicky chudých půdách. V současné chvíli je však půdní nasycenost díky loňským vydatným srážkám zatím hodnocena na úrovni „**bez rizika sucha**“. Věřme, že to v tomto pozitivním módu během vegetace vydrží.



V následujícím období doporučujeme do ochrany révy vinné zahrnout také přípravky na svilušky. Svilušky způsobují především zpomalení růstu, jemnou skvrnitost listů, sprchávání a zasychání květenství. Od září do dubna bylo možné pod očky na révě a v prasklinách borky dvouletého dřeva pozorovat vajíčka, které vypadají jako červený prášek. Proti sviluškám ošetřujeme také v následujícím období ve fázi 9. listů. Pokud zaznamenáte výskyt tohoto škůdce, určité provedte aplikaci přípravku **NISSORUN 10 WP**.



INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nové Zámky (SK)		
Golianovo - Darmoty (SK)		

Legenda

slabý

střední


silný

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

PROFI

HOBBY




SPIROX D

TOPAS

plíseň révová

PROFI

HOBBY



CUPROXAT

CHAMPION