

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 7

Týden: 25

Období: 22. 6. - 28. 6. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ



Na vinicích dochází neustále k dynamickému zvyšování tlaku infekce padlí. Roli zde hrají zejména vysoké teploty a nulové srážky minulého období. Proto musíme u této choroby předpokládat vhodné podmínky pro šíření a to zejména na významně záhřevných místech. Nejdříve příznaky padlí signalizují například keře v řádcích nejbližší u silnic, které mohou fungovat jako indikátor infekce na dané lokalitě. V následujícím období lze nadále predikovat vysoké teploty s možnými sporadickými srážkami a tedy infekční tlak předpokládáme, že bude sílit. V období před kvetením a těsně po něm doporučujeme použití vhodných systémových přípravků a nadále také v kombinaci se sírou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ




Na některých lokalitách se již mohly projevit první známky napadení. Někde už vystoupalo infekční riziko plísně révové dokonce na vysoký stupeň. Se silným tlakem se už nyní mohou potýkat vinaři například v Pavlově nebo ve Strážnici. Ohroženy budou v následujícím období především náchylné odrůdy nebo ty s hustějším květenstvím (např. Müller Thurgau, Lena, Johanitter). Právě na takových místech bude nutné ochranu posilovat a volit kombinované přípravky s vhodnými účinnými látkami. Naopak v Kobylí nadále přetrvávají jen mírné podmínky pro šíření významných houbových chorob révy. Výhledově lze očekávat v budoucím období vyšší teploty s přeháňkami, což by vytvořilo velmi vhodné podmínky pro pokračování plísně révové.

Riziko rozvoje:  slabé

 střední

 silné

Výhled počasí



Další důležité informace:

V roce 2020 byl obecně infekční tlak plísňových chorob ve srovnání s tímto obdobím vyšší. Aktuální situace na vinicích však v tuto chvíli napovídá, že by nás letos mohly nepříznivé tlaky houbových chorob opět pozlobit. V těchto dnech lze totiž na téměř všech lokalitách pozorovat středně silný tlak jak plísňě révové, tak padlí révového. Bude nyní tedy hodně záležet na včasném podchycení nástupu obou chorob a vhodnou ochranou zamezit jejich dalšímu pokračování. **Doporučujeme nyní používat hlavně systémové a kombinované přípravky.**

Během kvetení rostliny neošetřujte. Zejména při vysokých teplotách a silném slunečním svitu by v takovém případě mohlo dojít k výraznému poškození květenství a negativnímu dopadu na sklizňovou kvantitu. Po kvetení se dle doporučení z etiket výrobků aplikují plné dávky přípravků.

Pro hobby pěstitele révy vinné, kteří sympatizují s ekologií na vinicích, nabízíme řady **NATURA** - **Bylinková směs na plísň** (směs mleté skořice a hřebíčku) proti houbovým chorobám a **Bylinková směs na svlušky** (s obsahem mydlice a skořice) s účinností proti svluškám s vysokým protipožerovým a repelentním efektem.



INTENZITA INFEKČNÍHO TLAKU DLE VYBRANÝCH LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice	slabý	střední
Bzenec	střední	střední
Čejkovice	střední	střední
Kobylí	slabý	slabý
Lednice	střední	střední
Mikulčice	střední	slabý
Mikulov	střední	střední
Nosislav	střední	střední
Pavlov	slabý	silný
Popice	střední	střední
Přítluky	střední	slabý
Sedlec	střední	střední
Strážnice	střední	silný
Svatobořice	střední	střední
Valtice	slabý	slabý
Velké Bílovice	střední	střední
Velké Pavlovice	střední	slabý
Znojmo	slabý	střední
Modra (SK)	střední	střední
Šenkvice (SK)	střední	střední
Nové Zámky (SK)	střední	střední
Golianovo - Darmoty (SK)	střední	silný

Legenda



DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY



Legenda

