

Okénko zahrádkáře.

První polovina měsíce července byla teplotně mírně nadprůměrná. Dešťové srážky za toto období jsou na Znojemsku ve výši 25 – 53 mm. Nejméně spadlo dešťových srážek v Hnanicích, Stošíkovicích, Těšeticích, Vrbovci a Slupi (25 – 30 mm). Nejvyšší dešťové srážky byly zaznamenány v Hostěradicích a Hrádku (46 – 53 mm).

Dle výskytu motýlků ve feromonových lapacích byl zaznamenán vrchol druhé letové vlny obaleče jablečného. Na vrcholcích letorostů jabloní u citlivých odrůd jsou stále znatelné příznaky padlí. Velký výskyt mšic je na vrcholcích letorostů u švestek a slivoní., U meruněk jsou plně zralé plody odrůdy Karola, Orange Red, Sylvercot a začínají zrát plody odrůdy Goldrich. U broskvoní začínají zrát nejranější odrůdy Amsdenova, Redwin a Luna. U jabloní dozrává raná odrůda Wista Bella.

U kerů vinné révy pokračuje rychlý růst letorostů i zálistků, letorosty již přesahují horní dvojdrátko. Réva vinná je v růstové fázi vývoje bobulí ve velikosti malého až středního hrášku. Na vrcholových listech se u některých odrůd objevuje plstnatost révových listů.

U jabloní a hrušní ošetřujeme především proti obaleči, mšicím a také proti padlím. Ošetřujeme kombinovanými přípravky proti houbovým chorobám: Talent 0,05% nebo Zato 50 WG 0,015%, na škůdce přidáme Mospilan 20 SP 0,02% nebo Decis Mega 0,01% a listovou výživu Wuxal Calcium 0,2% proti hořké pihovitosti plodů.

U révy, kde je nyní stále velmi vysoká vnímavost malých bobulí k houbovým chorobám, aplikujeme postřik, ke kterému použijeme Melody Combi 65 WG 0,18% nebo Gabrio Top 0,2% a přidáme přípravek na padlí Prosper 0,05% nebo Topas 100 EC 0,03% či Kumulus WG 0,3%, který omezuje kadeřavost a plstnatost révových listů. Přípravek Kumulus neaplikujeme za vyšších teplot. Pokud máme slabší růst, přidáme přípravek na posílení růstu na bázi kyseliny huminové Envi Star nebo Energen.

Hlavní prací u révy vinné je stále prostrkování letorostů do dvojdrátko, vylamování zálistků v zóně hroznů a osečkování nejvyšší části letorostů. Keře révy jsou letos poměrně husté a stále ještě můžeme při „zelených pracích“ vylomit malé letorosty, které zahušťují révový keř. V letošním roce je vysoká násada a můžeme tak současně se zelenými pracemi ještě stále redukovat počet hroznů, především u stolních odrůd a odrůd s velkým hroznem.

Ing. Jaromír Čepička