

Okénko zahrádkáře.

Teplotní průběh první srpnové dekády byl nadprůměrný, stejně jako úhrn dešťových srážek. Dešťové srážky za první dekádu se pohybovali v rozpětí od 37 mm (Stoškovice, Hrádek) přes 60 mm (Těšetice, Slup), až po 90 mm (Branišovice, Vrbovec a Znojmo).

Dle výskytu motýlků ve feromonových lapacích byl zaznamenán další vrchol letové vlny obaleče jablečného a švestkového. Na vrcholcích letorostů jabloní jsou stále zřetelné příznaky padlí a zvyšuje se četnost výskytu svilušek. U některých odrůd hrušní je velký výskyt rzi hrušňové na listech. U meruněk jsou sklizeny plody pozdních odrůd Hargran, Harogen a Bergeron. U broskvoní jsou zralé plody odrůdy Redhaven, dozrává odrůda Fairhaven, Red Robin a Halehaven. U jabloní jsou sklizeny plody letních odrůd. Plody ostatních odrůd rychle zvyšují svojí hmotnost. Dozrávají plody odrůdy švestek Čačanská najbolja.

U keřů vinné révy pokračuje rychlý růst letorostů i zálistků. Réva vinná u pozdních odrůd je v růstové fázi vývoje bobulí ve velikosti velkého hrášku. Dozrávají nejranější odrůdy Čabaňská perla, Vostorg a Arkadia, začínají „zaměkat“ bobule odrůd Iršai Oliver, Solaris, Prim a Muškát moravský. U modrých odrůd se zabarvují hrozny. V současné době jsou velmi vhodné podmínky pro šíření padlí na listech a bobulích, plísně révové na mladých listech a zálistcích a také plísně šedé na hroznech. V období vysokých teplot a srážek musíme zkrátit intervaly ošetření na 7 – 10 denní interval. V uzavřených lokalitách u citlivých odrůd je nyní vhodné ošetřovat proti padlí a plísni šedé ještě v kratším intervalu. Stále přetrvává vysoký výskyt plstnatosti na mladých listech citlivých odrůd. Stále se objevují další keře s výskytem chřadnutí a odumírání kmínků (ESCA) a také příznaky fytoplasmového žloutnutí (u bílých odrůd) či červenání (u modrých odrůd) listů (Stolbur).

U jabloní a hrušní ošetřujeme především proti obaleči a mšicím. Ošetřujeme přípravkem Mospilan 20 SP 0,02% nebo Decis Mega 0,01% s listovou výživu Wuxal Calcium 0,2% proti hořké pihovitosti plodů.

U révy, kde je nyní stále velmi vysoká vnímavost bobulí k plísni šedé a révové, padlí, aplikujeme postřik, ke kterému použijeme Champion 50 WG 0,2% nebo Flowbrix 0,3%, přidáme přípravek na padlí Prosper 0,06% nebo Kumulus WG 0,3%, který omezuje kadeřavost a plstnatost révových listů a ještě přidáme přípravek proti plísni šedé Teldor 500 SC 0,1% nebo Scala 0,2%.

Po sklizni meruněk je vhodná doba pro letní řez stromů, kdy využíváme možnosti zmlazení a snížení koruny stromů. Volíme systém „průklestového“ typu řezu v závislosti na stáří, velikosti a hustotě koruny, odstraňujeme zahušťující větve, jednoleté stojící vlky a celkově se snažíme řezem snížit celkovou výšku i objem koruny stromu. U starých stromů nikdy nezkracujeme jednoleté výhony.

Hlavní prací u révy vinné je udržení zelené listové stěny v opěrné konstrukci a osečkováním letorostů se snažíme je udržet těsně nad horním dvojdrátím a také odstraňujeme mladé letorosty. Osečkováním také odstraníme i mladé listy napadené plísni révovou či kadeřavostí. V nastávajícím týdnu je předpoklad nižších letních teplot, což využijeme pro částečné odlistění zóny hroznů u modrých a bílých pozdních odrůd.

Ing. Jaromír Čepička