

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 15

Týden: 33

Období: 17. 8. - 23. 8. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ



Na více lokalitách se ve vinicích objevují příznaky padlí révy, zejména jsou teď velmi dobře určitelné na bobulích. Ideální podmínky pro rozvoj infekce byly zejména v posledním červnovém týdnu, kdy byly velmi příznivé podmínky vlhkosti vzduchu. Znovu se tak ukázalo, jak důležité bylo včasné provedení preventivní ochrany, a to již v době před kvetením. U pozdních odrůd je stále možné použití síry (KUMULUS nebo SULFOMAX) a to až do období začátku zrání, blednutí bobulí, příp. do začátku vybarvování. V případě velmi silného poškození použijte KARATHANE NEW v kombinaci se sírou. Postup infekce by se měl tímto zásahem výrazně omezit. Tlak padlí je stále na všech lokalitách hodnocen jako silný.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



/PLÍSEŇ ŠEDÁ



U všech odrůd nastoupila a probíhá fáze vybarvování bobulí. Přetrvává nebezpečí sekundárního šíření plísně révy, protože byly v minulém období na většině lokalit opakovaně splněny podmínky sekundární infekce. Během nočních ovhčení došlo na napadených rostlinných částech ke sporulaci patogenu a následně k dalším infekcím. Momentálně je aktuální především preventivní ochrana proti plísni šedé. Toto opatření se týká především středně raných a pozdních odrůd. Ideálně pro takové odrůdy doporučujeme přípravek SWITCH s kontaktním i systémovým účinkem. U raných odrůd a zejména tam, kde již došlo k patrnému rozvoji choroby, jsou nyní nejlepší volbou přípravky s krátkou ochrannou lhůtou (14 dní) jako TELDOR, MAGNICUR QUICK nebo PROLECTUS s krátkou OL. Synergicky působícím pomocníkem v boji s plísněmi je náš přípravek DRAFOS.


Riziko rozvoje:  slabé

 střední

 silné



Výhled počasí



Další důležité informace:

Momentální velmi teplé počasí přišlo po vydatných srážkách vhod. V srpnu jsou takové dny při vybarvování a počínajícím zrání révy příznivé. Ideální by však bylo, aby nebyly tropické i noci. Pro tvorbu cukrů jsou optimální teploty mezi 25-35°C. Pokud teploty přesáhnou 35°C v kombinaci se suchem, lze očekávat zpomalení tvorby cukrů v listech a ukládání v bobulích. **Aktuální dlouhodobě teplé počasí proto může vést k dynamickému nárůstu cukrů.** Důsledkem potom může být v následujících týdnech u některých raných odrůd vysoká cukernatost, nižší kyseliny a také nedostatečná vyzrálост aromatických látek. **Pro zrání bílých odrůd by teď bylo spíše optimální střídání teplých dnů a chladných nocí.** Dosavadní průběh počasí zatím nesměle naznačuje, že výrazná by mohla být především kvalita modrých hroznů pro výrobu červených vín. **O dalším vývoji kvality hroznů na vinicích dále rozhodně především příznivé slunečné dny, množství dalších srážek a vlhkost vzduchu.** Výhledově to zatím dle předpovědi v tomto směru vypadá pozitivně.

Ve vinicích v integrované produkci doporučujeme nejlépe využít systémové fungicidy působící zároveň na plíseň révou i šedou: **MELODY COMBI, PEGASO F, MILDICUT, CYMBAL.** V současné chvíli jsme na vinicích přibližně o týden zpoždění a stále na keřích rostou nové přírůstky, zálistky, které se budou podílet na tvorbě cukrů. Proto je tyto nutné nyní chránit před dalším napadením plísněmi pomocí vhodných fungicidů a ideálně za podpory listových hnojiv především na bázi draslíku a fosforu.



obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Svatý Jur (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nitra (SK)		
silný	střední	slabý

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

VIVANDO

KARATHANE NEW

MELODY COMBI

MILDICUT

VIVANDO

SERCADIS

CYMBAL

FOLPAN

SULFOMAX

SULFOMAX

FOLPAN GOLD

CHAMPION

silný

střední

slabý