

Ochrana ovocných dřevin a révy vinné.

Druhá červnová dekáda byla ve znamení nadprůměrných teplot a podprůměrných srážek ve srovnání s dlouholetým normálem. Celkový úhrn dešťových srážek od počátku června je na Znojemsku 20 až 45 mm. U třešní jsou zralé plody středně pozdních odrůd Vanda, Granát, Těchlovan a dozrávají pozdní odrůdy Kordia, Van a Tamara. U višní zraje odrůda Morellen Feuer. U meruněk je již sklizená nejranější odrůda Aurora, dozrává odrůda Leskora a začínají zrát odrůdy Karola, Radka a Silvercot. Plody odrůdy Velkopavlovická jsou ještě zelené a dále propadávají. U broskvoní je zdravotní stav stromů dobrý s mírně nadprůměrnou násadou plodů a bude žádoucí u hodně „nasazených stromů“ v tomto období mladé plůdky ještě „protrhat“. Velmi dobrá je násada plůdků u slivoní a švestek. U stromů jabloní a hrušní je celkově nižší násada plůdků, začal červnový propad malých plůdků. Přesto některé stromy mají vysokou násadu a u těchto stromů je vhodná určitá redukce počtu plůdků, především u odrůd s „kyticovitou“ plodností. Objevují se kolonie mšic, včetně mšice krvavé a je značný nálet obaleče jablečného. Keře révy mají velké množství letorostů s velkými přírůstky do délky a celkově jsou značně „zahuštěné“. Je velký počet květenství a rychle narůstají zálísky. Nejranější a PIWI odrůdy jsou již odkvetlé, je předpoklad do jednoho týdne, že budou keře ostatních odrůd révy již odkvetlé.

V této vývojové fázi u jabloní a hrušní je nutné počítat během následujícího období s dalším ochranným postřikem proti houbovým chorobám, především padlí a škůdcům – mšicím, píd'alkám a obaleči jablečnému. Ošetřujeme přípravky: Zato 50 WG 0,015% nebo Topas 100 EC 0,05%, dále Wuxal kalcium 0,2% proti hořké pihovitosti a na škůdce přidáme Decis Mega 0,01%, nebo Mospilan 20 SP 0,02% či Karate se ZEON 0,05%. Je vhodné dát do postřiku také olej Rock Effekt (0,5%), který „odpuzuje“ škůdce.

U révy druhý „vegetační“ postřik provádíme těsně po odkvětu a použijeme k tomu přípravky na plíseň révovou Folpan 0,2% nebo Momentum 0,2% či Melody Combi 0,15%, na padlí Kumulus WG 0,3% nebo Prosper (Pronto) 0,1%.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

U keřů révy nyní prostrkujeme letorosty do dvojdrátí a vylamujeme zálísky v zóně hroznů. V letošním roce je velmi dobrá násada květenství a tak musíme redukovat počet květenství, především u stolních odrůd a odrůd s velkým hroznem.

Mladé, nově vysázené stromky a sazenice révy, nyní vydatně zaléváme, neboť vláhová bilance půdy, je nedostatečná. Zlepšení vláhové bilance půdy v blízkosti mladého stromku či révové sazenice výrazně zlepšíme mulčem z trávy či plevelů na povrchu půdy.

Ing. Jaromír Čepička.