

Ochrana ovocných dřevin a révy vinné.

Velmi teplé období a bez větších dešťových srážek pokračuje i na začátku července. Vyskytly se lokální bouřky s úhrnem dešťových srážek kolem 20 mm (Braníšovice, Hodonice a Hrádek).

U třešní jsou zralé plody pozdní odrůdy Tamara. U meruněk jsou zralé plody odrůda Orangered a dozrávají plody odrůdy Velkopavlovická na „nemocných“ větvích, na zdravých větvích začínají plody měnit barvu ve světlejší odstíny zelenkavě – žluté. Plody jsou menší velikosti. U broskvoní je zdravotní stav stromů stále velmi dobrý. Dozrávají plody nejranějších odrůd: Luna, Harbinger, Fertilia Morettini a Redwin. Velmi dobrá je násada plůdků u slivoní a švestek i když část plodů stále opadáva.. U stromů jabloní a hrušní je celkově nižší násada plůdků, pokračuje u zimních odrůd jejich propad. U některých stromů jabloní je velký výskyt kolonií mšic, především mšice - vlnatky krvavé a je také značný nálet obaleče jablečného. Dozrávají jablka odrůd Stark Earlis, July Red a Wistabela. „Kondice“ keřů révy je všeobecně stále velmi dobrá s dobrým odkvětem a nárůstem zálístků. Na některých keřích ještě přetrvává výskyt kadeřavosti listů na vrcholcích letorostů.

V této vývojové fázi u jabloní a hrušní je nutné počítat během následujícího období s dalším ochranným postřikem mimo stromů s dozrávajícími plody proti padlí a škůdcům – mšicím a obaleči jablečnému. Ošetřujeme přípravky: Zato 50 WG 0,015% nebo Topas 100 EC 0,05%, dále Wuxal kalcium 0,2% proti hořké pihovitosti a na škůdce přidáme Decis Mega 0,01%, nebo Mospilan 20 SP 0,02% či Karate se ZEON 0,05%. Pokud ošetřujeme jen proti mšicím, tak ošetřujeme selektivním přípravkem Pirimor DP v koncentraci 0,05% nebo přípravkem Mospilan 20 SP 0,02%. Je vhodné dát do postřiku také olej Rock Effekt (0,5%), který „odpuzuje“ škůdce.

U révy provedeme ke konci dalšího týdne třetí „vegetační“ postřik, který je důležitý při ochraně malých bobulí, a použijeme k tomu přípravky na plíseň révovou Melody Combi 0,15% či Folpan 0,2%, na padlí Kumulus WG 0,3% nebo Prosper (Pronto) 0,1%. Na podpoření růstu na suchých půdách můžeme použít přípravek Envi Star 0,2%.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

U keřů révy nyní prostrkujeme letorosty do dvojdrátí a vylamujeme zálísky v zóně hroznů. V letošním roce je vysoká násada hroznů a tak je nutný redukovat jejich počet, především u stolních odrůd a odrůd s velkým hrozem.

Mladé, nově vysázené stromky a sazenice révy, stále vydatně zaléváme, neboť vláhová bilance půdy, je nedostatečná. Zlepšení vláhové bilance půdy v blízkosti mladého stromku či révové sazenice výrazně zlepšíme mulčem z trávy či plevelů na povrchu půdy.

Ing. Jaromír Čepička.